

1. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a participação popular tem sua maior expressão no(a):
 - a) Conselho Municipal de Saúde
 - b) Associação de bairros
 - c) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
 - d) Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde
 - e) Conselho de classe
2. O Sistema Único de Saúde, tal como foi definido na constituição de 1988 e nas leis orgânicas da saúde, tem como um de seus princípios a:
 - a) universalidade, que significa o atendimento de qualquer pessoa em qualquer condição de saúde em qualquer serviço de saúde.
 - b) equidade, que significa priorizar os pobres, dando-lhes prioridade na programação em saúde.
 - c) integralidade, que significa atenção às dimensões biopsicossocioespirituais dos indivíduos e suas famílias.
 - d) descentralização, que significa desconcentração do poder político-administrativo das ações e serviços de saúde.
 - e) regionalização, que significa restringir o atendimento aos usuários que residem na área de abrangência do serviço de saúde.
3. A visita domiciliar:
 - a) deve ser realizada somente em casos em que haja necessidade de observação do ambiente físico onde habita o usuário.
 - b) é de responsabilidade do agente comunitário de saúde, já que foi treinado e é remunerado para tal.
 - c) favorece o estreitamento do vínculo profissional-usuário mais que a consulta realizada na unidade de saúde.
 - d) ajuda no ensino de estudantes porque apresenta situações em que este sozinho é obrigado a improvisar.
 - e) precisa ser planejada para que se consiga atingir os objetivos que determinam a escolha dessa modalidade de atendimento.
4. O maior desafio da fase atual da reforma sanitária, que implica não apenas a garantia do acesso dos usuários é:
 - a) reorientação das lógicas burocrática e profissional.
 - b) ter o usuário como centro do sistema de saúde.
 - c) a presença marcante dos atores jurídicos
 - d) entender o direito à saúde como um direito individual.
 - e) a institucionalidade do SUS.
5. A Gestão Plena do Sistema de Saúde Municipal está fundamentada em o município apresentar:
 - a) rede de atendimento à saúde contemplando, no mínimo, os níveis primário e secundário.
 - b) consórcio com municípios vizinhos com a finalidade de proporcionar assistência completa à saúde a toda a população.
 - c) Conselho Municipal de Saúde implantado por lei.
 - d) rede própria de assistência à saúde em nível primário e credenciamento para os níveis secundário e terciário.
 - e) Comissão de Integração Ensino e Serviço.
6. A comunidade tem papel fundamental junto aos serviços de saúde. Em relação ao SUS, a atividade comunitária tem o objetivo de:
 - a) implementar ações de infraestrutura e saneamento.
 - b) estimular a participação de toda a comunidade no SUS.
 - c) direcionar ações visando à eficácia.
 - d) controlar as ações visando diminuir a procura pelos serviços de saúde.
 - e) fiscalizar ações de vigilância em saúde.
7. A concretização das linhas de cuidado acontece, fundamentalmente, pela:
 - a) Ação intersetorial.
 - b) Constituição de equipes de referência e apoio matricial.
 - c) Estratégia saúde da família e comunidade
 - d) Trabalho em equipe.
 - e) Necessidades de saúde da comunidade.
8. A integralidade é um princípio do SUS em que:
 - a) todos os brasileiros têm direito à saúde.
 - b) é a continuidade da assistência à saúde, em todos os âmbitos, está garantida.
 - c) tende a reforçar as ações intersetoriais e a construção de uma nova governança na gestão de políticas públicas.
 - d) torna o Sistema Único de Saúde mais justo.
 - e) incorpora os direitos sociais ligados à cidadania.
9. O incentivo ao parto normal é um dos eixos da Política Nacional de:
 - a) Atenção básica
 - b) Promoção da saúde
 - c) Vigilância em Saúde
 - d) Melhoria da qualidade
 - e) Humanização

- 10.** São os principais componentes do processo de trabalho em saúde:
- a) insumos, instrumentos ou ferramentas, pacientes e profissionais de saúde.
 - b) estrutura, processos e resultados.
 - c) finalidade, ferramentas de trabalho, pessoal e insumos.
 - d) objetivos, estrutura física dos serviços, materiais e equipamentos e pacientes.
 - e) objetivos, meios e condições, objeto e agentes.
- 11.** O Conselho Nacional de Saúde é composto por:
- a) 50% de usuários, 25% de profissionais de saúde e 25% de gestores, prestadores e centros formadores.
 - b) 25% de usuários, 50% de profissionais de saúde e 25% de gestores, prestadores e centros formadores.
 - c) 25% de usuários, 25% de profissionais de saúde e 50% de gestores, prestadores e centros formadores.
 - d) 10% de gestores, 30% de prestadores e 60% de profissionais da saúde.
 - e) 50% de usuários e 50% de gestores.
- 12.** O SUS desenvolve várias ações e programas, entre os quais está o Humaniza SUS. De acordo com esta informação, é correto afirmar que a Política Nacional de Humanização foi instituída pelo Ministério da Saúde no ano de:
- a) 2001
 - b) 2002
 - c) 2003
 - d) 2004
 - e) 2005
- 13.** O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) está organizado em quatro fases que se complementam e que conformam um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica, são elas:
- a) planejamento, adesão e contratualização, desenvolvimento e controle das ações.
 - b) adesão e contratualização, desenvolvimento, avaliação externa e repactuação.
 - c) adesão, desenvolvimento, controle e avaliação externa.
 - d) planejamento, desenvolvimento, avaliação externa e recontratualização.
 - e) desenvolvimento, controle, avaliação externa e recontratualização.
- 14.** As Redes de Atenção à Saúde (RAS) podem ser caracterizadas por:
- a) formar relações entre os diferentes pontos de atenção tendo a Atenção Primária à Saúde como centro de comunicação e porta de entrada do usuário no sistema de saúde, planejar e organizar as ações segundo as necessidades de saúde de uma população específica, ofertar atenção contínua e integral e o cuidado multiprofissional e compartilhar objetivos e compromissos com os resultados, em termos sanitários e econômicos.
 - b) estabelecer diferentes conexões de atenção, desenvolver a atenção básica à saúde como centro de comunicação, organizar as ações segundo as necessidades de saúde de uma população geral, ofertar atenção integral, definir os objetivos e resultados conforme as metas traçadas.
 - c) propiciar diferentes pontos de atenção a saúde de forma a compartilhar responsabilidades entre os diversos segmentos que compõem a porta de entrada ao sistema de saúde.
 - d) promover o planejamento e organizar as ações de saúde, tendo como foco a atenção primária em saúde como porta de entrada.
 - e) criar as condições e meios capazes de atender as necessidades da população, ofertar as ações básicas e de média complexidade, também, como porta de entrada ao Sistema Único de Saúde.
- 15.** A Integração Horizontal corresponde a:
- a) Diretriz das Redes de Atenção a Saúde.
 - b) Fundamentos e atributos das Redes de Atenção à Saúde.
 - c) Objetivo das Redes de Atenção a Saúde.
 - d) Organização das Redes de Atenção a Saúde.
 - e) Fusão ou aliança estratégica das Redes de Atenção a Saúde.

Leia o texto abaixo para responder à questão 16.

“É creditado a Hipócrates, em torno de 400 AC, o uso de um tubo de madeira como um dreno em uma ferida operatória. No Brasil, em 2014, foram realizados cerca de 151 mil procedimentos cirúrgicos ortopédicos. A artroplastia é uma intervenção razoavelmente segura que pode levar a um alto alívio considerável da dor e diminuir a incapacidade, pois permite que uma nova articulação, funcione normalmente. O uso desses procedimentos tem aumentado em razão dos bons resultados alcançados. Levando em consideração apenas as mudanças demográficas, estima-se que o número de indicações para Artroplastia de Quadril (ATQ) e Joelho (ATJ) irá aumentar 40% até 2021” (PRONANDA, 2015).

16. A prescrição de enfermagem ao paciente no pós-operatório imediato de cirurgias ortopédicas, principalmente ATQ e ATJ, com presença de drenos de sucção, como o Hemovac. Nesse sentido, em relação ao cuidado e manuseio com sondas e drenos, é correto afirmar que:

- a) o registro da localização do dreno, tipo, quantidade e consistência da drenagem devem ser registrados de seis em seis horas no período pós-operatório imediato.
- b) o dreno a vácuo, do tipo Penrose, é um sistema eficiente de drenagem fechada, pois, cria um vácuo que suga os líquidos para um recipiente de coleta de secreção.
- c) ao cuidar de uma ferida com dreno, o enfermeiro limpa o local de inserção de modo circular, do centro para fora.
- d) a cobertura de um dreno a vácuo solicita camadas adicionais de gaze, a fim de favorecer a pressão negativa da drenagem.
- e) nas cirurgias ortopédicas, depois da limpeza da ferida cirúrgica, é indicado que a base do dreno Hemovac seja protegida com bolsa de colostomia adaptada para este tipo de dreno.

17. Ao verificar a frequência do pulso de um paciente, a enfermeira observa que ele praticamente desaparece com uma pressão muito branda. Na ocasião da evolução desse achado, a enfermeira estaria mais correta em registrar que o pulso do paciente está:

- a) diminuído
- b) fino
- c) cheio
- d) normal
- e) ausente

18. A sífilis, é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pelo *Treponema pallidum*, tem caráter sistêmico e de evolução crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência. É uma doença de transmissão sexual ou materno-fetal (em qualquer momento da gravidez), podendo produzir, respectivamente, a forma adquirida ou congênita da doença. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em relação ao cuidado de enfermagem durante o pré-natal a gestantes sífilíticas.

- () Após o aconselhamento solicitar: o VDRL na primeira consulta e no terceiro trimestre da gestação.
- () Realizar o tratamento da gestante e do parceiro concomitantemente, mesmo que este último não tenha a confirmação do seu diagnóstico por meio de teste sorológico.
- () Realizar o tratamento da gestante com qualquer medicamento, exceto a penicilina

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) V, F, V
- b) V, V, V
- c) F, V, V
- d) F, F, V
- e) V, V, F

Leia o texto abaixo para responder à questão 19

“O risco de queda do paciente está presente em hospitais, ambulatorios e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. A taxa de queda de pacientes em hospitais de países desenvolvidos variou entre 2,3 a 7 quedas por 1.000 pacientes-dia”(OLIVEIRA, 2017). A queda do paciente faz parte do rol do chamado indicador sensível à enfermagem e sua avaliação é um dos indicadores de avaliação da qualidade hospitalar, além de constituir um dos protocolos de segurança do paciente.

19. Sobre o Risco de queda do paciente, analise as afirmativas abaixo.

- I. As quedas podem ser acidentais, fisiológicas não antecipáveis e fisiológicas antecipáveis.
- II. A escala de Morse é utilizada para avaliação do risco de queda em pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
- III. O Diagnóstico de Enfermagem Risco de quedas da Taxonomia NANDA, acompanha o Protocolo de prevenção de quedas

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

- a) I e III
- b) I, II e III
- c) III
- d) II e III
- e) I

20. "O planejamento faz parte do que chamamos de ciclo administrativo, o qual engloba um conjunto de tarefas e atividades necessárias para administrar uma organização de maneira sequencial e contínua. Este ciclo é composto de pelo menos quatro etapas: o planejamento; a organização-desenvolvimento; a execução-direção; e o controle-avaliação" (UFSC, 2016). Considere a associação entre as etapas do ciclo administrativo e suas atividades e correlacione as colunas.

- 1) Planejamento
- 2) Organização-desenvolvimento
- 3) Execução-direção
- 4) Controle-avaliação

- () disponibilizar recursos, gerir as competências, repor materiais de consumo, etc.
- () tomar decisões, executar as ações planejadas, adaptar-se ao contexto da ação planejada.
- () analisar o impacto da execução na ação planejada, verificar se os objetivos foram alcançados, propor melhorias.
- () definir objetivos, formular estratégias, analisar a realidade, identificar oportunidades e ameaças.

A sequência correta é:

- a) 4, 3, 2, 1
- b) 3, 4, 2, 1
- c) 3, 4, 1, 2
- d) 2, 3, 4, 1
- e) 2, 4, 1, 3

21. Em relação a classificação do assédio moral nas relações, assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

- () Assédio vertical- é praticado pelo servidor hierarquicamente superior (chefe) para com os seus subordinados.
- () Assédio horizontal- é praticado entre colegas de serviço de mesmo nível hierárquico.
- () Assédio ascendente - é praticado pelo subordinado que possui o conhecimento práticas inerentes ao processo produtivo sobre o chefe.

A sequência correta é:

- a) V, F, V
- b) V, V, V
- c) F, V, V
- d) F, F, V
- e) V, F, F

22. O Programa Brasileiro de Segurança do Paciente (PBSP) elaborou vários protocolos clínicos para prevenção e controle de infecção hospitalar. Considere a associação entre os protocolos para prevenção e as medidas recomendadas e correlacione as colunas.

- 1) Prevenção de Pneumonia associada á ventilação mecânica - PAV
- 2) Prevenção de Infecção de corrente sanguínea relacionada a acesso vascular central.
- 3) Prevenção de Infecção de trato urinário associado ao uso de cateter vesical de demora.
- 4) Prevenção de infecção de sítio cirúrgico

- () Antissepsia cirúrgica de mãos e braços, tomar banho com água e sabão antes da cirurgia.
- () Técnica asséptica na passagem do cateter urinário e sistema fechado; revisão diária da indicação do cateter.
- () precauções máxima de barreira durante o procedimento de inserção do acesso vascular central, antissepsia com Clorexidina antes do procedimento de inserção do acesso vascular.
- () avaliação ventilatória diária, elevação da cabeceira da cama a 45°, monitoramento da pressão do balonete do tubo endotraqueal.

A sequência correta é:

- a) 1, 2, 3, 4
- b) 4, 3, 2, 1
- c) 3, 4, 1, 2
- d) 2, 3, 4, 1
- e) 2, 4, 1, 3

23. A preparação pré-cirúrgica dos doentes diabéticos tem como pressuposto a normalização da glicemia antes, durante e após o procedimento, bem como a monitoração do paciente para alterações glicêmicas e complicações cardiovasculares durante a sua recuperação. De acordo com a avaliação do escore da American Society of Anesthesiologists (ASA), o paciente que apresenta o quadro de Diabetes Mellitus, de difícil controle, com comprometimento da atividade normal e com impacto sobre a anestesia e cirurgia é classificado como:

- a) grau 2
- b) grau 3
- c) grau 4
- d) grau 5
- e) grau 6

Leia o Texto abaixo para responder à questão 24.

O artigo II, inciso IV da Resolução Cofen nº 458/2014 preconiza Enfermeiro Responsável Técnico (ERT):

[...] profissional de Enfermagem de nível superior, nos termos da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que tem sob sua responsabilidade o planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de Enfermagem, a quem é concedida, pelo Conselho Regional de Enfermagem, a ART.

24. Sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), assinale a alternativa correta.

- a) A(o) Enfermeira (o) com ART representa todos os outros técnicos de nível superior da instituição.
- b) A(o) Enfermeira (o) com ART responde pelos procedimentos diretos realizados por sua equipe profissional.
- c) a ART é um documento oficial emitido pelo COREn, que se encarrega de definir quem são os responsáveis técnicos por determinado serviço.
- d) Todo(a) Enfermeiro(a) Gestor(a), municipal ou estadual, deve possuir a ART.
- e) Considerando sua natureza legal perante o COREn, o(a) Enfermeira(a) com ART deve realizar o dimensionamento de pessoal da sua instituição.

25. As Anotações de Enfermagem fornecem dados que irão subsidiar o enfermeiro no estabelecimento do plano de cuidados/ prescrição de enfermagem; suporte para análise reflexiva dos cuidados ministrados; respectivas respostas do paciente e resultados esperados e desenvolvimento da Evolução de Enfermagem (COFEN, 2016). Sobre as regras importantes para a elaboração das Anotações de enfermagem, analise as afirmativas abaixo.

- I. Devem ser precedidas de data e hora, informando se o local, obedece ao horário de verão.
- II. Observar e anotar como o paciente chegou: Procedência do paciente (residência, pronto-socorro, transferência de outra instituição ou outro setor intra-hospitalar).
- III. O uso do carimbo pelos profissionais da Enfermagem é facultativo.

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

- a) I e III
- b) I, II e III
- c) III
- d) II
- e) I

26. A (o) Enfermeira (o) deve utilizar instrumentos da Administração, bem como ter em mãos os recursos físicos, materiais, humanos, tecnológicos e informações e transformá-los utilizando do ciclo organizacional de planejamento, organização, direção e controle para atingir resultados (GARCIA, 2017). Sobre a Comunicação escrita como instrumento para o gerenciamento em Enfermagem, correlacione as colunas:

- 1) Livros de ocorrências
- 2) Escala de Enfermagem
- 3) Prontuário

() Do usuário: todo atendimento prestado; Do funcionário: a vida funcional relacionada à Enfermagem.

() registrar as intercorrências do período e os aspectos relevantes para continuidade do serviço.

() registrar a Escala de atribuições (mensal e diária) e escala de sítios funcionais.

A sequência correta é:

- a) 1, 2,3
- b) 3, 2, 1
- c) 2, 3, 1
- d) 1, 3, 2
- e) 3, 1, 2

27. A Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiu abordar a Higiene das Mãos (HM) com uma visão unificada para que os profissionais possam focar em apenas cinco indicações, que tem como objetivo facilitar o entendimento dos momentos em que há riscos de transmissão de micro-organismos pelas mãos, memorizá-los e incorporá-los nas atividades assistenciais (Da Silva Junior, 2017). Sobre a Higiene das Mãos, analise as afirmativas abaixo.

I. Ao estabelecer os 5 momentos para HM, dois antes do contato com o paciente e três após o contato ou exposição a fluidos, a OMS valoriza os momentos essenciais para a higiene das mãos e segurança do paciente.

II. Os momentos relacionados a segurança do profissional são: antes do contato com o paciente e após risco de exposição a fluidos corpóreos.

III. A participação do paciente é reconhecida como um importante componente nas estratégias multimodais de melhoria da adesão da HM.

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

- a) I e III
- b) I, II e III
- c) III
- d) II
- e) I

- 28.** Em relação a aplicação do frio na enfermagem obstétrica, assinale V (verdadeiro) ou F (falso).
- () O uso do gelo é de amplo conhecimento no campo da enfermagem obstétrica, tendo sido utilizado na forma de compressa na região perineal em caso de episiorrafia com hematomas e/ou edema.
 - () A aplicação do frio tem como efeito adicional o alívio do espasmo muscular e a redução de inflamações e de edemas na etapa pós-parto.
 - () destaca-se que os efeitos do gelo quando aplicado 12 horas após o início das complicações perineal pós-parto são determinantes na redução do metabolismo celular e do consumo de oxigênio nos tecidos adjacentes não atingidos.
- A sequência correta é:
- a** V, F, V
 - b** V, V, V
 - c** V, V, F
 - d** F, F, V
 - e** V, F, F
- 29.** As Infusões Intravenosas (IV) são instiladas pela gravidade isoladamente ou por um aparelho de infusão, uma máquina elétrica ou movida a bateria que regula e monitora a administração de soluções IV. Sobre administração de soluções IV, é correto afirmar que:
- a** as veias da mão e do antebraço normalmente são usadas para inserção em lactentes menores de um ano.
 - b** a venopunção é uma espécie de ferida. Uma prática correta é a troca de curativo a cada 4 horas.
 - c** ao finalizar a administração de soluções IV, registre no rótulo da seringa, o local onde foi administrado e o tipo de medicamento.
 - d** no caso de infusões IV por gravidade, o enfermeiro confere a quantidade de gotas que caem na câmara de gotejamento a cada minuto e, ao ajustar a pinça rolete, o número de gotas é aumentado ou diminuído, até que o gotejamento esteja compatível com o volume calculado.
 - e** as complicações associadas à infusão IV são a sobrecarga circulatória e a infiltração, que é o escape do fluido intravenoso para dentro do tecido. A flebite, formação de trombos e embolia pulmonar são decorrentes de eventos adversos com o equipo.
- 30.** Na prática de enfermagem, ações assistenciais e gerenciais são indissociáveis. Estudos apontam para os desafios dos enfermeiros na gerência do cuidado em emergência, como superlotação, manutenção da qualidade do cuidado e utilização da liderança como instrumento gerencial. Assim, servindo de dispositivo técnico-assistencial, além de orientador para atenção e a gestão nas urgências, bem como organizador de demanda, o acolhimento inclui a:
- a** notificação compulsória
 - b** chefia e liderança
 - c** vigilância epidemiológica
 - d** classificação de risco
 - e** atendimento imediato
- 31.** As Precauções Específicas são baseadas na forma de transmissão das doenças infecciosas e devem ser utilizadas para a assistência a pacientes suspeitos, sabidamente infectados ou colonizados por patógenos transmissíveis e de importância epidemiológica. Sobre as luvas de procedimento, as situações em que devem ser utilizadas, são:
- a** no contato com paciente que possui alguma doença infecciosa.
 - b** apenas quando houver risco de contato com fluidos corporais de um paciente que possui alguma doença infecciosa.
 - c** em todos os procedimentos que envolvam contato com o paciente.
 - d** quando houver risco de contato com fluidos corporais ou mucosa e no contato com pacientes com microrganismos multirresistentes.
 - e** no contato com utensílios, classificados como não críticos.
- 32.** O trauma é toda lesão produzida por um agente mecânico ou físico. Na avaliação primária de uma vítima suspeita de trauma e consequente Parada Cárdio-Respiratória (PCR) encontrada caída na rua, a primeira ação imediata é:
- a** verificar a respiração por até um minuto.
 - b** avaliar a circulação.
 - c** avaliar o nível de consciência.
 - d** estabilizar a coluna cervical.
 - e** avaliar estado neurológico.

33. No âmbito do raciocínio clínico, o uso de um Sistema de Linguagens Padronizadas (SLP) auxilia na organização do conhecimento. No que se refere a terceira etapa do Processo de Enfermagem (PE), planejamento, para administrar os medicamentos com segurança, avalie as afirmativas abaixo.

- I. Para comunicar os cuidados de enfermagem relacionados à terapia medicamentosa com precisão aos outros enfermeiros e aos demais profissionais de saúde, o enfermeiro deve utilizar um SLP.
- II. Para o planejamento do cuidado, a NIC é o único SLP utilizado por enfermeiros pelo mundo.
- III. O planejamento de enfermagem requer diagnósticos precisos que orientarão o julgamento de prioridades, a elaboração dos resultados desejados e a seleção de intervenções adequadas para o paciente em terapia medicamentosa.

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

- a) I e II
- b) I e III
- c) III
- d) II e III
- e) I, II e III

34. A hanseníase continua sendo um dos grandes problemas de saúde pública, na atualidade brasileira está presente principalmente em países subdesenvolvidos. Atinge populações mais pobres, com condições precárias de moradia, baixo nível de escolaridade e fluxos migratórios que facilitam a difusão dessa endemia (SOUZA, 2002). Sobre a educação em saúde direcionada para familiares de pacientes com hanseníase, é correto afirmar que:

- a) ocorre pela ação educativa individual, que ocorre através de uma comunicação interpessoal por interação direta pessoa a pessoa.
- b) ocorre pela ação educativa que é realizada com grupos, com envolvimento do público alvo, que, nessa ocasião deverá expor suas dificuldades, para que o coletivo indique as decisões relacionadas a saúde.
- c) o Enfermeiro é o responsável pelas ações educativas.
- d) a ação educativa em saúde na comunidade objetiva ações assistenciais aos familiares de pacientes com hanseníase, permitindo, desenvolver uma consciência crítico político-partidária.
- e) cabe ao enfermeiro, por ocasião, das ações educativas na comunidade, identificar os pacientes portadores de hanseníase.

35. Segundo Barros et al, 2015, uma das dificuldades de operacionalizar o Processo de Enfermagem (PE) é [...] a visão de que o Processo de Enfermagem só pode ser bem desenvolvido em ambientes hospitalares (p. 55). Aliado a esta compreensão e à especificidade do papel do Enfermeiro na Atenção Básica, muitos poderão afirmar que não é possível realizar o PE nesse espaço. Sobre o Processo de Enfermagem na Atenção Básica, analise as afirmativas abaixo.

- I. Na Atenção Básica, não se atende somente um indivíduo doente (órgãos biologicamente adoecidos). O processo saúde-doença tem outra complexidade, que envolve o social e o subjetivo, e exige outras ferramentas, como a escuta qualificada e a clínica ampliada.
- II. Ao realizar o PE envolvendo abordagens de projetos terapêuticos coletivos para usuários e comunidade, é importante salientar que grupos que têm a mesma característica clínica (sem a perda da singularidade dos sujeitos) podem ser contemplados com o PE coletivo (ex: grupo de hipertensos, diabéticos, ações em território, etc.).
- III. A evolução ou avaliação de Enfermagem na Atenção Básica é o momento de reavaliação da efetividade do cuidado e não existe um período fechado de 24 horas para este procedimento, como no caso do hospital. O usuário é reavaliado conforme as metas pactuadas no seu último atendimento com o Enfermeiro, dentro da longitudinalidade da assistência.

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

- a) I e III
- b) I, II e III
- c) III
- d) II e III
- e) I

36. Sobre a coleta de amostra de escarro para exame laboratorial de um paciente adulto, assinale a alternativa correta.

- a) Coletar amostra antes do horário do paciente dormir a noite.
- b) Coletar amostra logo após o paciente acordar ou após tratamento por inalação.
- c) Coletar amostra entre as refeições, com uso de água ao despertar.
- d) O local de armazenamento do escarro deve ser frasco de vidro não estéril.
- e) Oferecer ao paciente uma generosa ingestão hídrica antes da coleta.

- 37.** Sobre a imunização contra a Hepatite B para adultos, incluindo idosos, é correto afirmar que:
- a** devem receber o esquema completo com três doses os adultos/idosos que não tiverem comprovação.
 - b** a segunda e a terceira doses devem ser aplicadas, respectivamente, sessenta e cento e vinte dias após a primeira dose.
 - c** os adultos/idosos que tiverem o esquema incompleto com uma ou duas doses, devem reiniciar o esquema completo.
 - d** a vacinação contra a Hepatite B para adultos/idosos é realizada nos Centros de Saúde Municipais somente com a indicação médica.
 - e** a vacinação contra a Hepatite B deve ser aplicada nos contatos sexuais de adultos/idosos portadores de Hepatite B nos CRIEs (Centro de Referência em Imunização específica).
- 38.** Com relação a uma liminar concedida pela Justiça Federal de Brasília, a partir de ação movida pelo Conselho Federal de Medicina, que suspendeu a consulta de enfermagem e requisição de exames por Enfermeiros na Atenção Básica, e atualmente suspensa, para julgamento de mérito, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1, Brasília. A alternativa que consta a normatização e regulamentação do exercício da Enfermagem é:
- a** Lei nº 8.080/90 e Lei 8.142/90.
 - b** Lei nº 8.967/94 e Resolução Cofen 195/97.
 - c** Portaria nº 2.436/17 e Portaria nº 4.279/10.
 - d** Lei nº 7.498/1986 e Resolução Cofen 195/97.
 - e** Lei nº 7.498/1986 e Resolução Cofen 172/94.
- 39.** Em relação à Hipertensão Arterial Sistêmica, conforme o Caderno de Atenção Básica nº 37, Pressão Arterial de Adultos maiores de 18 anos, os valores considerados para Hipertensão Estágio 1 são:
- a** Pressão sistólica (mmHg): < 120 e Pressão diastólica (mmHg) < 80.
 - b** Pressão sistólica (mmHg): < 139 e Pressão diastólica (mmHg) < 89.
 - c** Pressão sistólica (mmHg): <159 e Pressão diastólica (mmHg) < 99
 - d** Pressão sistólica (mmHg): < 179 e Pressão diastólica (mmHg) <109
 - e** Pressão sistólica (mmHg): ≥ 180 e Pressão diastólica (mmHg) ≥ 110
- 40.** As RAS têm como objetivo promover a integração de ações e serviços de saúde para prover uma atenção à saúde de forma contínua, integral, de qualidade, responsável, humanizada, com vistas à consolidação dos princípios e diretrizes do SUS (Ministério da Saúde, 2010 – portaria nº 4.279, de 30/12/2010). Compete a RAS:
- I. Formar relações horizontais entre os diferentes pontos de atenção
 - II. Planejar e organizar as ações segundo as necessidades de saúde de uma população específica
 - III. Ofertar atenção contínua e integral
 - IV. Cuidado multiprofissional
 - V. Compartilhar objetivos e compromissos com os resultados, em termos sanitários e econômicos:
- A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:
- a** I, III e V
 - b** II, III e IV
 - c** I, II e IV
 - d** I, II, III, IV e V
 - e** I, IV e V
- 41.** Na RAS Níveis de atenção são arranjos produtivos conformados segundo as densidades tecnológicas singulares, variando do nível de menor densidade (APS), ao de densidade tecnológica intermediária (atenção secundária à saúde), até o de maior densidade tecnológica (atenção terciária à saúde) (Ministério da Saúde, 2010). Quanto a Atenção Primária em Saúde, no Brasil denominada Atenção Básica, a portaria que a regulamenta em todo Território Nacional é:
- a** Portaria nº 2.488/11
 - b** Portaria nº 8.080/90
 - c** Portaria nº 2.436/17
 - d** Portaria nº 4.279/10
 - e** Portaria nº 1.645/15.

42. A Rede Cegonha, instituída em todo território nacional, propõe às mulheres: o direito ao planejamento reprodutivo, a atenção humanizada à gravidez, parto, abortamento e puerpério e às crianças: direito ao nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis. Sobre as primeiras vacinas ofertadas a criança, com preferência ainda no ambiente hospitalar, analise as afirmativas abaixo.

- I. Deve ser aplicada as vacinas BCG e Hepatite B.
- II. Deve ser aplicada as vacinas BCG, Hepatite B e Rotavírus.
- III. A Criança recebe, além da primeira dose da vacina contra a Hepatite B, mais três doses aos 2, 4, 6 meses (pois a vacina contra Hepatite B é parte da vacina Pentavalente).
- IV. Imediatamente após a injeção da vacina Hepatite B, aparece no local uma pápula de aspecto esbranquiçado e poroso (tipo casca de laranja), com bordas bem nítidas e delimitadas.
- V. O intervalo mínimo entre a 1ª e a 2ª dose, da vacina Hepatite B, é de 30 (trinta) dias.

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

- a) I e IV
- b) I, III e V
- c) I
- d) II, III e IV
- e) I, II, III, IV e V

43. Sobre a Estratégia do Tratamento Diretamente Observado, instituído no país como forma de mobilização social nas ações de controle e no tratamento dos doentes com Tuberculose, é correto afirmar que:

- I. O TDO consiste na observação da ingestão dos medicamentos, preferencialmente todos os dias.
- II. Na fase de ataque, preferencialmente todos os dias, e no mínimo três vezes por semana na fase de manutenção do tratamento.
- III. A medicação deve ser administrado por profissionais de saúde ou eventualmente por outra pessoa, desde que devidamente capacitada e sob monitoramento do enfermeiro.
- IV. Nos finais de semana e feriados os medicamentos são autoadministrados.
- V. Não administrar a medicação nos finais de semana sem a supervisão de um profissional da equipe de saúde.

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

- a) I, II, III e V
- b) II, III, IV e V
- c) I, II, III e IV
- d) I, II, III, IV e V
- e) I, II e III

Leia o Texto abaixo para responder à questão 44.

Planejamento é um instrumento para diagnosticar a realidade e propor alternativas para transformá-las, indicar os meios para viabilização e as oportunidades para execução das ações planejadas, ocasionando sempre uma reavaliação do que se foi planejado. Em relação ao Planejamento em Saúde, temos o Planejamento Estratégico Situacional – PES, como um dos tipos de planejamento possíveis de ser aplicado. Abaixo um quadro síntese do PES.

Momento Explicativo	É quanto se analisa a realidade presente e o hiato que existe entre o agora e o futuro desejado. Nesse se desenvolve a complexa tarefa de identificar e selecionar problemas, explicar com profundidade as causas de cada um e do conjunto dos mesmos. Trata-se de marcar a situação inicial do plano. É um momento importante que deve contar com a participação ampla de todos os atores envolvidos para análise dos problemas que os afetam.
Momento Normativo	É o momento em que se estabelece o que deve ser. Nele são definidas as operações em que diferentes cenários levam à mudança da situação inicial em direção à situação ideal. Deve, portanto, estar centrado no direcionamento de suas operações para efetivação dos objetivos, sendo, para isto, necessário promover a discussão cuidadosa da eficácia de cada ação em relação à situação objetivo, relacionando os resultados desejados com os recursos necessários e os produtos de cada ação.
Momento Estratégico	É o momento em que se analisam as restrições e as facilidades que interferem no cumprimento do desenho normativo. Relaciona-se às questões de viabilidade e, portanto, aos obstáculos a vencer para aproximar a realidade da situação eleita como objetivo. Neste momento são identificados os atores envolvidos no processo e o grau de concordância e oposição dos mesmos ao futuro desejado e às ações previstas.
Momento Tático-Operacional	É o momento decisivo, quando toda a análise feita nos momentos anteriores e transforma em ação concreta. É o momento de realizar e de monitorar as ações, com proposições de mudanças ou de ajustes ao longo do processo.

Fonte: Lacerda, Botelho, Colussi (2012, pag. 32)

44. De acordo com o quadro acima, a Territorialização, executada na Estratégia Saúde da Família é identificada no PES no momento:

- a) Momento Explicativo.
- b) Momento Normativo.
- c) Momento Estratégico.
- d) Momento Tático-Operacional.
- e) Não se identifica com nenhum dos momentos do PES.

Leia o Texto abaixo para responder à questão 45.

Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), os DSS são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Fato que precisa ser também levado em consideração ao realizarmos o Planejamento de Ações de saúde com base na Territorialização.

45. São doenças relacionadas aos Determinantes Sociais da Saúde:

- I. Tuberculose e Hanseníase
- II. Depressão, Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus
- III. Dengue, Zica e Chikungunya
- IV. AIDS
- V. Sífilis

A alternativa que contém todas as alternativas corretas é:

- a) I
- b) I e II
- c) II, III e IV
- d) I, III, IV e V
- e) I, II, III, IV e V

46. As lesões por pressão (LP) são consideradas eventos adversos que causam danos a saúde dos pacientes. Nesse contexto, a preocupação com a segurança do paciente tornou-se assunto prioritário na área da saúde, sendo necessário estabelecer, em cada instituição, uma política de avaliação do risco para LP com o objetivo de identificar os indivíduos em risco. Uma das ferramentas de avaliação de risco mais utilizadas em todo o mundo é a **Escala de Braden para Prever o Risco de Úlcera por Pressão**, desenvolvida por Barbara Braden. Os indicadores de avaliação dessa escala são:

- a) percepção sensorial, umidade, pressão, mobilidade, nutrição, condição física e percepção neurológica.
- b) percepção mental, umidade, atividade, mobilidade, condição física, idade e cisalhamento.
- c) percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento.
- d) percepção neurológica, continência, atividade mental, idade, nutrição, pressão, fricção.
- e) percepção sensorial, atividade mental, continência, pressão, nutrição, fricção.

47. As aplicações externas de calor (termoterapia) e frio (crioterapia) são instrumentos importantes que auxiliam no tratamento de várias patologias ortopédicas e neurológicas. São recursos sintomáticos, que quando aplicados adequadamente, ajudam nas funções orgânicas e proporcionam conforto, podendo ser utilizadas através de água fria ou quente, vapor, compressas geladas e quentes, assim como, aplicações elétricas, raios infravermelhos, bolsas elétricas, duchas, etc. Sobre a **aplicação de calor e frio**, é correto afirmar que:

- a) cliente com diabetes e neuropática, queixando-se de dor no hálux direito, devido a unha encravada, é contraindicada a aplicação de calor, através da imersão do pé em água morna, para diminuir o processo inflamatório devido a perda de sensibilidade.
- b) cliente que sofreu traumatismo, com distensão muscular, durante a prática esportiva, é correta a indicação do calor após o trauma para diminuir o edema e diminuir a reação inflamatória após o trauma.
- c) cliente com artrite, inflamação em articulação, queixando-se de dor e rigidez articular, é correto a indicação do frio para diminuir a rigidez articular.
- d) cliente que sofreu trauma apresenta pequeno sangramento, é incorreto aplicar frio para o controle do sangramento.
- e) em regiões do corpo anestesiadas é correto aplicação do calor para a finalidade de reduzir a dor no pós-anestésico.

48. A Noradrenalina (NA) é o neurotransmissor do sistema nervoso simpático e precursor da adrenalina, sendo a droga de eleição no choque séptico, cuja finalidade é elevar a Pressão Arterial (PA) em pacientes hipotensos, que não responderam à ressuscitação por volume, e quase sempre utilizada durante as manobras da ressuscitação cardiopulmonar (RCP), como droga vasoconstritora. Sobre os cuidados de enfermagem relacionados à administração desta droga, é correto afirmar que:

- a) as infusões de NA podem ser infundidas por via endovenosa exclusivamente periférica, por bomba de infusão.
- b) por se tratar de uma potente droga vasoconstritora, é necessário a monitorização rigorosa da pressão arterial (PA) a cada quinze (15) minutos, principalmente durante o ajuste da dose, por bomba de infusão.
- c) o uso dessa droga pode ser interrompido sem o desmame progressivo.
- d) a droga deve ser usada diluída apenas em solução alcalina.
- e) em casos de infiltração da NA, quando administrada por via endovenosa, não há risco de necrose e escara no local.

49. A técnica mais comum de medição da pressão arterial é a auscultação com um esfigmomanômetro e um estetoscópio. Para executar a técnica correta de verificação da pressão arterial no braço de um adulto, o profissional de Enfermagem deverá observar alguns conceitos e cuidados. Sobre esse assunto, é correto afirmar que:

- a** o local inapropriado para medir a pressão arterial, não resulta em falsa ampliação dos sons, causando leituras imprecisas.
- b** idade, gênero, atividade física, medicamentos e fumo influenciam a pressão arterial, não devendo ser avaliados pelo profissional.
- c** a abraçadeira poderá ser aplicada em extremidades onde haja desvio arteriovenoso, ou fistula.
- d** a abraçadeira deve ter um tamanho apropriado para a extremidade do paciente, caso contrário, causa falsa leitura baixa ou alta.
- e** a posição sentado, mantendo os pés no chão ou com pernas cruzados, é ideal para avaliação da pressão arterial.

50. A Política Nacional de Humanização (PNH), instituída em 2003, pelo Ministério da Saúde, busca colocar em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Tem a finalidade de valorizar os diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores. Para que essas mudanças sejam alcançadas nos serviços de saúde segue os princípios norteadores do SUS. De acordo com os princípios da PNH, a transversalidade trata-se de:

- a** integração entre Município e Estado, juntamente com a União, buscando melhorias para o SUS.
- b** práticas interdependentes e complementares que precisam ser entendidas para que ocorra a humanização.
- c** opiniões e práticas que atravessam as diferentes ações e instâncias, que aumentam o grau de abertura de comunicação intra e intergrupos.
- d** corresponsabilidade entre gestores, usuários e a participação coletiva nos processos e na gestão.
- e** os cidadãos brasileiros têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde sem nenhuma discriminação.



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E UNIPROFISSIONAL EM SAÚDE - 2018
Categoria Profissional: Enfermagem

GABARITO DO CANDIDATO

O gabarito poderá ser copiado, **SOMENTE**, no espelho constante no final do boletim de questões disponibilizado para este fim que somente será destacado no final de sua prova, pelo fiscal de sua sala.

QUESTÃO	ALTERNATIVA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

QUESTÃO	ALTERNATIVA
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	